SWINDON MEDICAL DIAGNOSTICS
德信醫療

新一代 NEW

SHINGRIX
帶狀皰疹(生蛇)疫苗

疫苗名稱	注射方法
Shingrix	肌肉注射
接種對象	**建議注射劑量**
18歲或以上高危人仕 50歲或以上	2針

接種時間表

第1針 — **相隔 2 至6個月** — **第2針**

完成第一針後，
相隔2至6個月接種第二針

甚麼是「生蛇」？

「生蛇」(醫學名稱：帶狀皰疹) 由水痘帶狀皰疹病毒所引致的傳染病，病毒會於水痘痊癒後潛伏體內的神經系統，凡感染過水痘，即使症狀多人士都有機會患病！生蛇可持續長達30天，神經與皮膚相連的任何地方都有機會生蛇，而產生的劇烈疼痛絕乎想像！

全身不同位置都有機會生蛇

誰有機會「生蛇」？

95%
成年人均具有「生蛇」風險

50歲
或以上人仕

1/3
成人會經歷「生蛇」

18歲
或以上高危人仕

「生蛇」痛楚大過「生仔」

生蛇急性痛症的**等級大於分娩和手術後的疼痛**，患者往往承受無限刑，甚至**持續幾年的神經痛**，如：

有時即使輕微觸碰或摩，患者都會感覺異常劇痛，需要長期服止痛藥以減輕痛楚，**嚴重影響日常生活和質量。**

「生蛇疫苗」常見問題

1 是否50歲以上人士才需要接種蛇針？

答：一般來說，不建議是50歲以上人士「生蛇」風險比較高，但是相對年輕一代都有「生蛇」個別發生過，只是當一個人壓力大，睡眠不足以及免疫力下降的時候，都有機會「生蛇」！

2 如果沒有出過水痘，就沒有機會生蛇？原因就究不用接種疫苗？

答：每個人感染帶狀皰疹症狀和反應都有差異，有些人可能不會出現明顯症狀，只有少量紅疹，都未不知道自己其實曾經感染過水痘，一旦出過水痘，就一定有機會「生蛇」，所以，為了確保健康，建議都最接種蛇針。

3 「生蛇」會傳染？

答：「生蛇」並不會傳染，但是有機會出現嚴重併發症，相對常見的情況是患者皮膚上傷口受感染發炎，有部分人「生蛇」後出現遠離神經痛，偏聾會有機會導致失聰，甚至死亡，如果患者正在懷孕期間「生蛇」，有機會影響胎兒，甚至失明，另外，如果感染腦炎不幸「入院」，有機會影響腦壞死，甚至失聰，只是有有神經過敏的部份，病毒就會有機會延續去。

4 如果「生蛇」主到面部及睜一個眼，患者眼會完了？

答：人體神經連通部分有在身體左右兩側，所以「生蛇」位置通常只是在一邊，兩個同時出現病毒機率極小，如果兩邊同時「生蛇」，那就代表患者抵抗力異常地低，容易出現嚴重併發症，死亡風險會變會變得相當高。

5 「生蛇」有高傳染症？

答：會發病前期會出現頭痛，全身乏力，甚至發燒，病發數天後，即使沒有出現特徵症狀，患者可能都會感到痛楚，發炎之外，或導致分泌有機會感到痛癢或疼痛，然後「生蛇」出現前期症狀，需要相當的人面臭，有部份患者之後會出現水泡，而水泡容易穿破，導致結疤，帶狀疱疹前，引起的皮膚大面一般會在2-3星期內痊癒，但有時候病毒有機會持續一星期甚至數月，所有「生蛇」病毒就代表相不一。

6 如水痘與「生蛇」屬於相同的疾病？

答：雖然兩者都是由相同病毒引發，但是實際上水痘與「生蛇」並不能相提並論，甚至來說，百水痘是令患者身上出現數百個病變的水泡，通常5-7日就能康復，「生蛇」病毒就可能持續一個月，而且有機會帶來併發症和發炎。

7 之前生過蛇，有需要再打蛇針嗎？

答：如果你曾經患過帶狀疱疹(生過蛇)，接種蛇針更有助預防再次患上這種病痛，雖然在患上帶狀疱疹症(生過蛇)，但無需相隔特定的時間才能接種Shingrix，即一般而言，在接種疫苗前，你無論曾疫身上的帶狀疱疹已經安全消退。

8 打了蛇針會否就能夠完不會「生蛇」？或者能夠治好「生蛇」？

答：蛇針只有預防效果，並沒有任何治療的作用，即是就算你就算你現在正患緊帶狀疱疹病毒而剛剛接種疫苗的有助對帶狀疱疹，並減低出現嚴重的風險，當一個人開始生病時，有人會對身患的病菌，等個人的手帶做著反分析，及於接種帶狀疱疹病毒疫苗之後，即時內也需，仍然有機會有機會有機會一星期甚至數月，所有「生蛇」病毒就有機會有機會一星期甚至數月，所有「生蛇」病毒就有機會有機會一星期甚至數月，所有「生蛇」病毒就